



المجموعة :  
Avermectin

# فابيكومك - ١٪، ٨٪

مبيد زراعي سام / مبيد حشري وعنكبي  
مركز مستحلب

مبيد حشري وعنكبي يعمل باللامسة وعن طريق الجهاز الهضمي.

التركيب: كل لتر يحتوي على:

أبامكتين

الميزات:

فابيكومك - ٨٪ : مبيد حشري وعنكبي فعال لمكافحة العديد من الحشرات في طور الحشرة الكاملة والتي يصعب مكافحتها مثل: صانعات الأنفاق، البسيلا، العنكبوت الحمراء، والعنكبوت الفضي والمفلطحة.

فابيكومك - ١٪ : ذو فعالية عالية لمدة أطول مقارنة بالمبيدات الأخرى، لا حتواه على نسبة عالية من المعنصر الفعال أفرمكتين B1a.

فابيكومك - ١٪ : يستعمل على عدد كبير من المحاصيل الزراعية الاقتصادية مثل البنودورة، الخيار، البازنجان، الفراولة، الحمضيات، نباتات الزينة.

الاستعمال:

الفترة الآمنة (أيام)	نسبة الاستعمال مل / ٢٠ لتر ماء	الافرة	المحصول
٧ - ٣	٧ - ٥	صانعات الأنفاق، دودة ثمار البنودورة، العنكبوت الأحمر، عنكبوت الصدأ.	البنودورة
٣ ١٠	٧ - ٥	صانعات الأنفاق، العنكبوت الأحمر.	الخيار، الباذنجان
٧	٧ - ٥	العنكبوت ذو النقطتين، العنكبوت الأحمر، العنكبوت الفضي.	الفراولة
٧	١٠	صانعات الأنفاق، العنكبوت الحمراء.	الحمضيات
—	٧ - ٥	العنكبوت الأحمر، صانعات الأنفاق.	نباتات الزينة

دونم = ١٠٠٠ م²

**تحذير:** يمنع استعمال المبيد على المحاصيل غير الواردة أعلاه، مع الإلتزام بفترات الأمان قبل عملية القطف.

**ملاحظات:**

- يجب أن لا يرش المحصول أكثر من ٥ رشات خلال الموسم.

- تبدأ ظهور نتائج المكافحة بعد ٣ - ٥ أيام من الرش مع العلم بأن تأثير المبيد يبدأ بعد رشه مباشرة.

- كمية محلول الرش يجب أن لا تزيد عن ١١٠ مل من المبيد فابيكومك - ٨٪ لكل دونم من الخضروات ونباتات الزينة.

**الأثر الضار على النبات :**

- لا يسبب أثر سلبي على النباتات إلا أنه لا يرش على أزهار القرنفل ونباتات الأسيجة الخاصة.

- سام للتفاحيات عند خلطها مع مركبات الكابتان.

**فترقة تحريم دخول الحقل المرشوش :**

يمنع دخول الحقل المرشوش قبل مرور ٢٤ ساعة من المعاملة ويسمح بالدخول عند جفاف محلول الرش على المحصول المعامل.

**قابلية الخلط:** قابل للخلط مع معظم المبيدات ولكن ينصح بعمل تجربة خلط بسيطة قبل الخلط.

\* تراكيب وأسماء تجارية أخرى : أبامكتين - ٨٪ (EC, SL), بامكتين - ٨٪ (EC, SL), ميسامكتين - ٨٪ (EC, SL) ، فابيكومك - ٢٪ وو.